


入院療養計画書 (初回レミケード治療を受けられる方へ)

入院日:平成 年 月 日 お名前(

)様

病名 (関節リ

項目	/			
	外来	入院時	点滴中	
達成目標	・治療の必要性が理解できる ・不安が表出できる	・治療の必要性が理解できる ・不安が表出できる	・副作用の出現が少なく 治療を終えることができる ・不安が表出できる	・レミケード終 指示がでる
与薬 点滴	・通常の外来投薬 	・外来で処方されている薬は、 そのまま内服を続けて下さい	・体を動かしてもよい針を入れて 点滴を開始します レミケードの点滴 250ml / 2時間 生理食塩水の点滴 500ml / 4時間	
検査	・ツベルクリン反応 ・胸部レントゲン ・採血・検尿	・採血・検尿		
測定		・身長・体重測定 ・血圧・脈拍測定	・点滴中は頻回に血圧脈拍を測定します	
食事			・制限はありません	
活動		・自由です	・点滴中はなるべくベッド上で過ごして下さい	
清潔				・退院後気分
排泄		・トイレ自由です	・点滴中でもトイレに行くことができます	
説明 指導	・医師からレミケードについて説明します ・胸部レントゲンの結果によっては、 CT撮影や内科受診があります ・予診票の記入 ・患者手帳をお渡しします ・承諾書をお渡しします	・承諾書の確認をします		・副作用がな 退院できま ・次回の外来 点滴につい 説明があり

注1 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等をすすめていくにしたがって変わっていくことがあります。

注2 入院期間については現時点で予想されるものです。

平成 年 月 日 主治医(

) 受け持ち看護師(


姫路赤十

入院療養計画書 (レミケード治療を受けられる方へ)

入院日:平成 年 月 日 お名前(

)様

病名 (関節リウ

項目	/			
	外来	入院時	点滴中	退院時
達成目標	・治療の必要性が理解できる ・不安が表出できる	・治療の必要性が理解できる ・不安が表出できる	・副作用の出現が少なく治療を終えることができる ・不安が表出できる	・レミケード終了指示がでる
与薬 点滴	・通常の外来投薬 	・外来で処方されている薬は、そのまま内服を続けて下さい	・体を動かしてもよい針を入れて点滴を開始します レミケードの点滴 250ml / 2時間 生理食塩水の点滴 500ml / 4時間	
検査	・血液・尿検査			
測定		・身長・体重測定 ・血圧・脈拍測定	・点滴中は頻回に血圧脈拍を測定します	
食事	・制限はありません			
活動		・自由です	・点滴中はなるべくベッド上で過ごして下さい	
清潔				・退院後気分不良ななければ入浴可能
排泄		・トイレ自由です	・点滴中でもトイレに行くことができます	
説明 指導	・入院準備について説明します ・医師がレミケードの説明をします			・副作用がなければ退院できます ・次回の外来予約説明があります

注1 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等をすすめていくにしたがって変わっていきます。

注2 入院期間については現時点で予想されるものです。

平成 年 月 日 主治医(

) 受け持ち看護師(

姫路赤十字