

膵がん化学療法レジメン一覧

| | | | |
|---|--------------------------|----|--------------------------|
| 1 | (2) FOLFIRINOX | 7 | (2) GEM (3投1休) |
| 2 | (2) GEM+Nab-PTX | 8 | (2) erlotinib+GEM (3投1休) |
| 3 | (2) GEM+S-1 (GEM day1,8) | 10 | (2) mFOLFIRINOX |
| 4 | (2) GEM (1投1休) | 11 | (2) nal-IRI+5-FU/LV |
| 5 | (2) GEM (2投1休) | | |

表の見方



問い合わせの際は、癌種と管理番号をお伝えください

1 FOLFIRINOX 1クール 14 日

| 薬品名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与日 |
|---------|------------------------|------|---------|
| エルプラット注 | 85 mg/m ² | 点滴注射 | day 1 |
| トポテシン注 | 180 mg/m ² | 点滴注射 | day 1 |
| 5-FU 注 | 400 mg/m ² | 点滴注射 | day 1 |
| | 2400 mg/m ² | 持続注射 | day 1~3 |

2 GEM+Nab-PTX 1クール 28 日

| 薬品名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与日 |
|---------|------------------------|------|--------------|
| アブラキサン注 | 125 mg/m ² | 点滴注射 | day 1, 8, 15 |
| ゲムシタビン注 | 1000 mg/m ² | 点滴注射 | day 1, 8, 15 |

3 GEM+S-1 (GEM day1, 8) 1クール 21 日

| 薬品名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与日 |
|---------|------------------------|------|----------|
| S-1 | 80 mg/m ² | 内服 | day 1~14 |
| ゲムシタビン注 | 1000 mg/m ² | 点滴注射 | day 1, 8 |

4 GEM(1投1休) 1クール 14 日

| 薬品名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与日 |
|---------|------------------------|------|-------|
| ゲムシタビン注 | 1000 mg/m ² | 点滴注射 | day 1 |

5 GEM(2投1休) 1クール 21 日

| 薬品名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与日 |
|---------|------------------------|------|----------|
| ゲムシタビン注 | 1000 mg/m ² | 点滴注射 | day 1, 8 |

7 GEM(3投1休) 1クール 28 日

| 薬品名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与日 |
|---------|------------------------|------|--------------|
| ゲムシタビン注 | 1000 mg/m ² | 点滴注射 | day 1, 8, 15 |

8 erlotinib+GEM(3投1休) 1クール 28 日

| 薬品名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与日 |
|-----------|------------------------|------|--------------|
| erlotinib | 80 mg/m ² | 内服 | 連日 |
| ゲムシタビン注 | 1000 mg/m ² | 点滴注射 | day 1, 8, 15 |

10 mFOLFIRINOX 1クール 14 日

| 薬品名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与日 |
|---------|------------------------|------|---------|
| エルプラット注 | 85 mg/m ² | 点滴注射 | day 1 |
| トポテシン注 | 150 mg/m ² | 点滴注射 | day 1 |
| 5-FU 注 | 2400 mg/m ² | 持続注射 | day 1~3 |

11 nal-IRI+5-FU/LV 1クール 14 日

| 薬品名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与日 |
|--------|------------------------|------|---------|
| オニバイド注 | 70 mg/m ² | 点滴注射 | day 1 |
| 5-FU 注 | 2400 mg/m ² | 持続注射 | day 1~3 |