
婦人科がん化学療法レジメン一覧

1	(2) ドキシル	15	(3)tri-weekly TC(卵巣癌)	33	(4) THP-ADR
2	(2) BV 維持療法(15mg/kg)	13	(3) アクチノマイシンD	34	(4) weekly TN
4	(2) CPT-11(60mg/m²)	14	(3) エトポシド	35	(4) weeklyTN+Bev
6	(2) CPT-11 70mg/m ²	19	(3) EMA/CO(day8~14)	3	(4) 旧 BV(PLD+BV day15)
7	(2) DC	20	(3) MTX(筋注)	36	(4) 旧 PLD+BV
17	(2) DTX(卵巣癌、子宮体癌)	22	(3) BEP(day16)	37	(4) Pembrolizumab+BV(子宮頚癌)
23	(2) GEM+DTX	24	(3) weekly TC(CBDCA AUC×2)	38	(5) Pembrolizumab+TC+BV
8	(2) GEM(2投1休 卵巣癌)	25	(3) CD(CBDCA+PLD)	39	(5) Cemiplimab(子宮頸がん)
9	(2) GEM(3投1休 卵巣癌)	26	(3) CD(CBDCA+PLD)+Bev	40	(5) CPT-11+BV
18	(2) weeklyCDDP[40mg/m³]	27	(3) GC(GEM+CBDCA)	41	(5) Pembrolizumab+TC
12	(2) ddTC (iv)	28	(4) GC(GEM+CBDCA)+Bev	42	(5) q6w Pembrolizumab+Lenvatinib
11	(2) ddTC 8-15	29	(4) GEM+Bev	43	(5) weekly NDP
10	(2) PLD+BV	30	(4) TN	44	(5) weekly TC+BV
16	(3) TC+BV	31	(4) TN+BV		
21	(3)tri-weekly TC(体癌▪頸癌)	32	(4) Pembrolizumab + Lenvatinib		



問い合わせの際は、癌種と管理番号をお伝えください

1 ドキシル

1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドキシル注	40 mg/ m ²	点滴注射	day 1

2 BV 維持療法(15mg/kg)

1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
アバスチン注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

4 CPT-11(60mg/m^2)

薬品名	標準	投与量	投与方法	投-	与日	
トポテシン注	60	mg∕ m i̇́	点滴注射	day	1	

6 <u>CPT-11(70mg/m²)</u>

1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
トポテシン注	70 mg/ m i	点滴注射	day 1

DC

1クール 21 日

	薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ŀ	セタキセル注	60 mg/ m ²	点滴注射	day 1
カ	ルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

17 DTX(卵巢癌、子宫体癌)

1クール 1 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル注	70 mg/ m i	点滴注射	day 1

23 GEM+DTX

1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン注	900 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8
ドセタキセル注	100 mg/ m i	点滴注射	day 8

8 GEM(2投1休 卵巣癌) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン注	700 mg/m [*]	点滴注射	day 1, 8

9 GEM(3投1休 卵巣癌)

1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン注	700 mg/ m i	点滴注射	day 1, 8, 15

1クール 7 日 18 weekly CDDP [40mg/m²]

1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
シスプラチン注	40 mg/m ²	点滴注射	day 1

12 ddTC(iv)

1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	80 mg/ m i	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

11 ddTC 8-15

1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日	
パクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1	

10 <u>PLD+BV</u>

1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドキシル注	40 mg/m ²	点滴注射	day 1
アバスチン注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

16 TC+BV

1クール 21 日

			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
アバスチン注	15 mg/kg	点滴注射	day 1
パクリタキセル注	175 mg/ m i	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

21 tri-weekly TC(体癌・頸癌) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	175 mg/ m i	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

15 <u>tri-weekly TC(卵巣癌)</u>

1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	175 mg/ m i̇́	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

13 <u>アクチノマイシンD</u>

1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
コスメゲン注	0.5 mg	静脈注射	day 1∼4

14 エトポシド

1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
エトポシド注	100 mg	点滴注射	day 1∼5

19 <u>EMA/CO (day8~14)</u>

1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
エンドキサン注	600 mg/ m i	点滴注射	day 1
オンコビン注	1 mg	静脈注射	day 1

20 MTX(筋注)

1クール 10 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
メソトレキセート注	20 mg	筋肉注射	day 1∼5

22 <u>BEP(day16)</u>

1クール 6 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ブレオ注	20 mg/m^2	点滴注射	day 1

24 weekly TC(CBDCA AUC×2) 1クール 7 日

Treeting to Compare	/ 10 0 	<u>*</u>	
薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	60 mg/ m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 2	点滴注射	day 1

25 CD(CBDCA+PLD)

1クール 28 日

_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		
	薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
	ドキシル注	30 mg/ m ²	点滴注射	day 1
7	カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

26 CD(CBDCA+PLD)+Bev 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドキシル注	30 mg/ m ੰ	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1
アバスチン注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

27 GC(GEM+CBDCA)

1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン注	1000 mg/ m ²	点滴注射	day 1, 8
カルボプラチン注	AUC =4	点滴注射	day 1

28 GC(GEM+CBDCA)+Bev

1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8
カルボプラチン注	AUC =4	点滴注射	day 1
アバスチン注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

29 GEM+Bev

1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15
アバスチン注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

30 TN

1クール 20 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	175 mg/ m i	点滴注射	day 1
アクプラ注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1

31 <u>TN+BV</u>

1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	175 mg/ m i	点滴注射	day 1
アクプラ注	80 mg/ m ²	点滴注射	day 1
アバスチン注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

32 Pembrolizumab + Lenvatinib

1クール 21 日

· citier citzentide i Ec	<u> </u>		
薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
レンビマカプセル	20 mg/day	内服	連日

33 THP-ADR

1クール 20 日

<u>———</u> 薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ピノルビン注	40 mg/m ²	点滴注射	day 1

34 weekly TN

1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	80 mg/ m i	点滴注射	day 1
アクプラ注	25 mg/ m ²	点滴注射	day 1

35 weekly TN+BV

1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	80 mg/ m i	点滴注射	day 1
アクプラ注	25 mg/ m i̇́	点滴注射	day 1
アバスチン注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

3 旧 BV(PLD+BV day15)

1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
アバスチン注	10 mg/kg	点滴注射	day 1

36 旧 PLD+BV

1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドキシル注	40 mg/ m i̇́	点滴注射	day 1
アバスチン注	10 mg/kg	点滴注射	day 1, 15

37 Pembrolizumab + BV(子宮頚癌) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
アバスチン注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

※Pembrolizumab+TC+BV の維持療法

38 Pembrolizumab+TC+BV

1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
アバスチン注	15 mg/kg	点滴注射	day 1
パクリタキセル注	175 mg/ m i	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

39 <u>Cemiplimab(子宮頸がん)</u>

1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
リブタヨ注	350 mg	点滴注射	day 1

40 <u>CPT-11+BV</u>

1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
アバスチン注	15 mg/kg	点滴注射	day 1
トポテシン注	70 mg/ m i̇́	点滴注射	day 1, 8, 15

41 Pembrolizumab + TC

1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
パクリタキセル注	175 mg/ m i	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

42 g6w Pembrolizumab + Lenvatinib 1クール 42 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	400	点滴注射	day 1

43 weekly NDP

1クール 7 日

<u> </u>		-	
薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
アクプラ注	30 mg/ m ²	点滴注射	day 1

44 weekly TC+BV

1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
アバスチン注	15 mg/kg	点滴注射	day 1
パクリタキセル注	60 mg/ m i	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 2	点滴注射	day 1