


婦人科がん化学療法レジメン一覧

1	(2) ドキシル	13	(3) アクチノマイシンD	35	(4) weeklyTN+Bev
2	(2) BV 維持療法(15mg/kg)	14	(3) エトポシド	3	(4) 旧 BV(PLD+BV day15)
4	(2) CPT-11(60mg/m ²)	19	(3) EMA/CO(day8~14)	36	(4) 旧 PLD+BV
6	(2) CPT-11 70mg/m ²	20	(3) MTX(筋注)	37	(4) Pembrolizumab+BV(子宮頸癌)
7	(2) DC	22	(3) BEP(day16)	38	(5) Pembrolizumab+TC+BV
17	(2) DTX(卵巣癌、子宮体癌)	24	(3) weekly TC(CBDCA AUC×2)	39	(5) Cemiplimab(子宮頸がん)
23	(2) GEM+DTX	25	(3) CD(CBDCA+PLD)	40	(5) CPT-11+BV
8	(2) GEM(2投1休 卵巣癌)	26	(3) CD(CBDCA+PLD)+Bev	41	(5) Pembrolizumab+TC
9	(2) GEM(3投1休 卵巣癌)	27	(3) GC(GEM+CBDCA)	42	(5) q6w Pembrolizumab+Lenvatinib
18	(2) weeklyCDDP[40mg/m ²]	28	(4) GC(GEM+CBDCA)+Bev	43	(5) weekly NDP
12	(2) ddTC(iv)	29	(4) GEM+Bev	44	(5) weekly TC+BV
11	(2) ddTC 8-15	30	(4) TN	45	DC+BV
10	(2) PLD+BV	31	(4) TN+BV	53	Dur+Ola維持療法(子宮体癌)
16	(3) TC+BV	32	(4) Pembrolizumab+Lenvatinib	54	Dur+TC(子宮体癌)
21	(3) tri-weekly TC(体癌・頸癌)	33	(4) THP-ADR	55	Dur維持療法(子宮体癌)
15	(3) tri-weekly TC(卵巣癌)	34	(4) weekly TN		

表の見方



問い合わせの際は、癌種と管理番号をお伝えください

1 ドキシル 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドキシル注	40 mg/m ²	点滴注射	day 1

2 BV 維持療法(15mg/kg) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ベバシズマブBS注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

4 CPT-11(60mg/m²) 1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
イリノテカン注	60 mg/m ²	点滴注射	day 1

6 CPT-11(70mg/m²) 1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
イリノテカン注	70 mg/m ²	点滴注射	day 1

7 DC 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル注	60 mg/m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

17 DTX(卵巣癌、子宮体癌) 1クール 1 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル注	70 mg/m ²	点滴注射	day 1

23 GEM+DTX 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン注	900 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8
ドセタキセル注	100 mg/m ²	点滴注射	day 8

8 GEM(2投1休 卵巣癌) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン注	700 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8

9 GEM(3投1休 卵巣癌) 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン注	700 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15

18 weekly CDDP[40mg/m²] 1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
シスプラチン注	40 mg/m ²	点滴注射	day 1

12 ddTC(iv) 1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

11 ddTC 8-15 1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1

10 PLD+BV 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドキシル注	40 mg/m ²	点滴注射	day 1
ベバシズマブBS注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

16 TC+BV 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ベバシズマブBS注	15 mg/kg	点滴注射	day 1
パクリタキセル注	175 mg/m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

21 tri-weekly TC(体癌・頸癌) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	175 mg/m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

15 tri-weekly TC(卵巣癌) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	175 mg/m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

13 アクチノマイシンD 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
コスメゲン注	0.5 mg	静脈注射	day 1~4

14 エトポシド 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
エトポシド注	100 mg	点滴注射	day 1~5

19 EMA/CO(day8~14) 1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
エンドキサン注	600 mg/m ²	点滴注射	day 1
オンコビン注	1 mg	静脈注射	day 1

20 MTX(筋注) 1クール 10 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
メソトレキセート注	20 mg	筋肉注射	day 1~5

22 BEP(day16) 1クール 6 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ブレオ注	20 mg/m ²	点滴注射	day 1

24 weekly TC(CBDCA AUC×2) 1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	60 mg/m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 2	点滴注射	day 1

25 CD(CBDCA+PLD) 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドキシル注	30 mg/m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

26 CD(CBDCA+PLD)+Bev 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドキシル注	30 mg/m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1
ベバシズマブBS注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

27 GC(GEM+CBDCA) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8
カルボプラチン注	AUC = 4	点滴注射	day 1

28 GC(GEM+CBDCA)+Bev 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8
カルボプラチン注	AUC =4	点滴注射	day 1
ベバシズマブBS注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

29 GEM+Bev 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15
ベバシズマブBS注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

30 TN 1クール 20 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	175 mg/m ²	点滴注射	day 1
アクプラ注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1

31 TN+BV 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	175 mg/m ²	点滴注射	day 1
アクプラ注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1
ベバシズマブBS注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

32 Pembrolizumab+Lenvatinib 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
レンビマカプセル	20 mg/day	内服	連日

33 THP-ADR 1クール 20 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ピノルビン注	40 mg/m ²	点滴注射	day 1

34 weekly TN 1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1
アクプラ注	25 mg/m ²	点滴注射	day 1

35 weekly TN+BV 1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1
アクプラ注	25 mg/m ²	点滴注射	day 1
ベバシズマブBS注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

3 旧 BV(PLD+BV day15) 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ベバシズマブBS注	10 mg/kg	点滴注射	day 1

36 旧 PLD+BV 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドキシル注	40 mg/m ²	点滴注射	day 1
ベバシズマブBS注	10 mg/kg	点滴注射	day 1, 15

37 Pembrolizumab+BV(子宮頸癌) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
アバスチン注	15 mg/kg	点滴注射	day 1

※Pembrolizumab+TC+BV の維持療法

38 Pembrolizumab+TC+BV 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
ベバシズマブBS注	15 mg/kg	点滴注射	day 1
パクリタキセル注	175 mg/m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

39 Cemiplimab(子宮頸がん) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
リブタヨ注	350 mg	点滴注射	day 1

40 CPT-11+BV 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ベバシズマブBS注	15 mg/kg	点滴注射	day 1
トポテシン注	70 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15

41 Pembrolizumab+TC 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
パクリタキセル注	175 mg/m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

42 q6w Pembrolizumab+Lenvatinib 1クール 42 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	400	点滴注射	day 1

43 weekly NDP 1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
アクプラ注	30 mg/m ²	点滴注射	day 1

44 weekly TC+BV 1クール 7 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ベバシズマブBS注	15 mg/kg	点滴注射	day 1
パクリタキセル注	60 mg/m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 2	点滴注射	day 1

45 DC+BV 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ベバシズマブBS注	15 mg/kg	点滴注射	day 1
ドセタキセル注	60 mg/m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

53 Dur+TC(子宮体癌) 1クール 20 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
イミフィンジ注	1120 mg	点滴注射	day 1
パクリタキセル注	175 mg/m ²	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

54 Dur+Ola 維持療法(子宮体癌) 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
イミフィンジ注	1500 mg	点滴注射	day 1

55 Dur 維持療法(子宮体癌) 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
イミフィンジ注	1500 mg	点滴注射	day 1

子宮頸がんには ベバシズマブBS でなく アバスチン を使用しています